

Curso Diagnóstico de Laboratorio en la Clínica Médica de hoy

Osteoporosis




Bioq. Ma. Virginia Melia

24/10/2017

INTRODUCCION

- El hueso es un tejido conectivo especializado en constante renovación.
- Cuando la masa ósea se estabiliza, el remodelado se mantiene estrechamente regulado, acoplando la resorción del hueso viejo dañado y la formación del nuevo.



ESTRUCTURA OSEA

Hay dos tipos básicos de hueso:


Cortical: (80% del esqueleto).


Funciones mecánicas y estructurales.

80-90% calcificado.

Trabecular: actividad metabólica relativamente alta y menor densidad.

5-20% calcificado.





Hueso = matriz orgánica mineralizada por depósitos de sales de **calcio**

Los niveles de estos marcadores son un reflejo dinámico de las tasas de remodelamiento óseo.





OSTEOPOROSIS

- Perdida neta de hueso.
- Incremento en la fragilidad del hueso
- Susceptibilidad a riesgo de fractura (diminución de DMO y de la calidad del hueso)

Principales causas de Osteoporosis

- Menopausia
- Edad avanzada
- Factores genéticos (estos determinan las variaciones en la densidad ósea)
- Otros factores no genéticos como : Act. física, nutrición, consumo de alcohol, cigarrillo u algunos medicamentos.






MARCADORES BIOQUIMICOS



Clasificación de Marcadores Bioquímicos de remodelado óseo.

- Pruebas de laboratorio no específicas
- Formación Osea: Proteínas sintetizadas por los osteoblastos
- Resorción Osea: Productos de la síntesis de los osteoclastos, de la matriz mineral y del colágeno.

LOS MARCADORES BIOQUIMICOS NO INFORMAN SOBRE EL NIVEL DE DMO POR LO TANTO NO CONFIRMAN PRESENCIA O AUSENCIA DE OSTEOPOROSIS . SON ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS





Pruebas de laboratorio no específicas

- 1) HEMOGRAMA
- 2) ERITROSEDIMENTACION Y PCR
- 3) UREA Y CREATININA (EVALUACION DE LA FUNCION RENAL)
- 4) HEPATOGRAMA
- 5) 25 OH VITAMINA D
- 6) TSH Y HORMONAS TIROIDEAS (EVALUACION DE LA FUNCION TIROIDEA)
- 7) PARATHORMONA
- 8) FOSFATEMIA
- 9) LDH
- 10) CALCEMIA/CALCIURIA (*Considerado un marcador de resorción*)
- 11) MAGNESEMIA
- 12) CALCITONINA
- 13) ALBUMINEMIA




MARCADORES DE FORMACION Y RESORCION OSEA

FORMACION	RESORCION
<ul style="list-style-type: none">● FOSFATASA ALCALINA● OSTEOCALCINA● PICP (PROPEPTIDO CARBOXITERMINAL DEL PROCOLAGENO TIPO I) Y PINP (PROPEPTIDO AMINOTERMINAL DEL PROCOLAGENO TIPO I)	<ul style="list-style-type: none">● HIDROXIPROLINA● PIRIDINOLINA y DEOXYPIRIDINOLINA● C- TELOPEPTIDO (BETA CROSS LAPS)

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

CALCIO: Distribución en organismo



El calcio iónico es el que se regula a través de la PTH y la vitamina D



FACTORES QUE CAUSAN DISMINUCION DEL CaT:

- Anticoagulante EDTA
- Hipoalbuminemias:

Calcemia corregida = calcemia medida + [0,8 x (4 – albuminemia)]

- Alcalosis
- Síndromes de Mala Absorción
- Deficiencia de Vitamina D

FACTORES QUE CAUSAN AUMENTO DEL CaT:

- Fármacos (ej: diuréticos tiazídicos)
- Acidosis
- Hiperparatiroidismo



Ca iónico

RESPONSABLE DEL EFECTO BIOLÓGICO

- Método: electrodo de ión selectivo
- Afectado por PH
- Debe mantenerse en anaerobiosis
- Tiene valor diagnóstico

**Ca iónico:
VR: (4,5 – 5,0 mg/dl)**



Calcio en Orina 24 hs

- Depende de:
- Absorción intestinal.
 - Remodelación Ósea.
 - Manejo renal.

.AUMENTA: En estados de sobrecarga salina, hipercalcemia, intoxicación por VIT D, tubulopatías, hipertiroidismo, tratamiento con furosemida.

.DISMINUYE: En procesos que cursan con retención salina, hipocalcemia, déficit d VIT D, insuficiencia renal, hipotiroidismo, y tratamiento con tiazidas.

Ca orina 24 hs
VR:(50 - 200 mg/24 hs)



Condiciones de Recolección

Muestra:

Dieta: Se sugiere *reducir la ingesta de lácteos y sus derivados* (quesos, manteca, crema, yogurt, etc.) durante tres (3) días previos a la recolección de la orina. Al cuarto día comenzar a recolectar la muestra. Modo de recolección: Descartar la primera orina de la mañana, y a partir de ahí recolectar **TODA LA CANTIDAD DE ORINA (SIN DESCARTAR NINGUNA)** incluyendo la primera de la mañana del día siguiente.



Fósforo Sérico

- Se encuentra el 85% en el hueso y el resto en tejidos blandos y líquidos tisulares. La mayoría circula libre , y un pequeño porcentaje unido a proteínas.
- Varía con el aporte de la dieta y tiene ritmo circadiano.
- Junto con el Calcio se asocian para constituir el tejido oseo al que le confieren su rigidez.
- Se observan concentraciones mayores en los primeros años de vida. (RN hasta 6,1 mg/dl)
- Las muestras no tiene que estar hemolizadas, ya que sale el fósforo del interior del GR y pueden dar falsos aumentos.
- Métodos de determinación: Técnicas espectrofotométricas.

Fosforo Sérico
VR:(2,5-4,5 mg/dl)




Tres hormonas regulan el metabolismo fosfocálcico.

1) PARATHORMONA

2) VITAMINA D

3) CALCITONINA

Parathormona
(VR:15 - 65 pg/ml)



1) PARATHORMONA

- Péptido secretado por la paratiroides cuando hay hipocalcemia.
- Genera un aumento de Ca y una disminución de P en el plasma.

Hueso: Aumenta la remodelación ósea (Aumenta el N° de osteoclastos y la osteólisis)


Riñón: Aumenta la reabsorción de Ca y disminuye la de P.

Acelera la formación de metabolitos de la Vit D

Intestino: Estimula indirectamente la absorción de Ca.

Los métodos generalmente utilizados son los que dosan ambos fragmentos de molécula, si el método dosara la molécula completa, al ir clivándose no se encontrarían valores reales de PTH.

PARATHORMONA



Porción activa

Pre-pro PTH (ribosomas)

Pro-PTH (Golgi)

PTH (Glándulas secretoras)

Durante la síntesis de la PTH se producen distintas modificaciones en la molécula hasta su liberación por las glándulas secretoras de la paratiroides

Porción inactiva y marcador de secreción de PTH (excepto en insuf renal)


★ La PTH en sangre no se une a ningún transportador y por ello su vida media es de unos 4 minutos.

★ El hígado y el riñón son los principales lugares de degradación, dando lugar a productos sin actividad biológica pero que modifican las medidas inmunológicas de esta hormona.

Se necesita Mg para su síntesis



TOMA DE MUESTRA Y METODOS DE DETERMINACION PARA PTH



Los métodos generalmente utilizados son los que dosan ambos fragmentos de molécula, si el método dosara la molécula completa, al ir clivándose no se encontrarían valores reales de PTH.
(**Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia** : se utilizan ac monoclonales para detectar el extremo amino y carboxilo terminal y asi detectar la molécula entera)



Luego de realizar la extracción con anticoagulante EDTA tripotásico, se debe separar del paquete globular lo más rápido posible y mantener refrigerada hasta su procesamiento, ya que la hormona es muy inestable.



2) VITAMINA D

•Tipos: Vit D3→ Se obtiene al ingerir ciertos pescado y por el impacto de los rayos UV sobre la epidermis.


Vit D2→ Se encuentra en alimentos de origen vegetal

•Su concentración está determinada por lo tanto por la exposición solar (variación estacional) y su aporte a través de la dieta.

•METABOLISMO:

•La vitamina D al ser liposoluble debe circular unida a proteína, hasta el hígado, donde sufre la primera hidroxilación **25 OH Vit D** → Forma mas abundante en circulación – **Tipo de Vitamina detectada en suero** -

•La segunda hidroxilación se produce en los riñones y forma el metabolito activo 1-25 OH vit D o **CALCITRIOL**



DOSAJE DE 25 OH VITAMINA D – Analiza disponibilidad de la vitamina en el cuerpo.

Muestra utilizada: suero


Técnica utilizada: *electroquimioluminiscencia*

VR: <15 ng/ml: Deficiencia. → Puede producir hiperparatiroidismo
15-30 ng/ml: Insuficiencia. 2ario, especialmente en adultos
30-100 ng/ml: Suficiencia. mayores y raquitismo en niños.
>100 ng/ml: Toxicidad.

CALCITRIOL/ 1, 25 (OH)₂ VIT D



Formación:

- No varía en relación a la exposición solar.
- La enzima que lo produce (**1 alfa hidroxilasa**) es regulada mediante PTH, niveles de fosfatemia y calcio iónico – Los esteroides sexuales también aumentan la act. de esta enzima.
- Aumenta la absorción de Ca desde el lúmen intestinal (No tanto a nivel óseo)
- No informa sobre reservas de Vit D
- La detección de calcitriol es muy engorroso, por ello se dosa 25 oh vit D.



3) Calcitonina

- Hormona **secretada por las células C de tiroides.**
- **Acción opuesta a la PTH** (Inhibe la resorción osea mediada por osteoclasto y aumenta la excreción renal de calcio)
- Útil en control de carcinoma medular de tiroides
- Niveles elevados en recién nacido, durante la gestación, y la lactancia.
- Sus niveles disminuyen hasta la edad adulta.
- **Muestra:** SUERO o PLASMA CON HEPARINA
- **Método:** *electroquimioluminiscencia*



MARCADORES DE FORMACION OSEA O DE ACTIVIDAD OSTEOLASTICA

FOSFATASA ALCALINA

- FAL SERICA: 60% hepática – 40 % ósea
- Presente en membrana de OSTEOLASTOS
- No es específica, ya que también se encuentra en placenta, intestino, hígado, riñón, leucocitos y próstata.
- Su concentración es mas alta en niños.
- Pico en adolescencia, y ligero incremento con los años.
- Metodo utilizado: CINETICO (UV)
- Se ve aumentado en ciertas enfermedades como Paget y osteomalacia.

FOSFATASA ALCALINA

VR:H : de 40 a 130 UI/L

M : se 35 a 105 UI/L

ISOENZIMAS DE LA FOSFATASA ALCALINA

VR DE ISOENZIMAS	HEPATICA	OSEA
Niños y adolescentes	< 25%	(70-90)%
Adultos	(45-80)%	(20-40)%
Lugar de síntesis	Células epiteliales del conducto biliar.	Producida por los osteoblastos
Aplicación Clínica	Enfermedad obstructiva hepática	Enfermedad metabólica ósea, asociada a incremento de la actividad osteoblástica



Las isoenzimas se diferencian por su estructura molecular, propiedades físicoquímicas, antigénicas y catalíticas.



OSTEOCALCINA SERICA

- Proteína no colágena mas importante de la matriz ósea. Representa el *2% de proteínas totales de hueso*
- Sintetizado por los **osteoblastos**
- Se deposita en el hueso como parte de las proteínas NO colágenas que se incorporan a la matriz ósea durante su maduración, durante esta incorporación algo pasa a sangre, por lo que se la considera un **índice de actividad sintética osteoblástica**.
- Su función es fijar el calcio
- Concentración elevada en la infancia - Pico en la pubertad.
- Su forma incompletamente descarboxilada ha mostrado ser predictiva del riesgo de fracturas en cadera.
- Método utilizado para su medición:
ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

OSTEOCALCINA SERICA
(VR:1- 48 ng/ml)




Osteocalcina:

- Tiene *ritmo circadiano* (pico 4 am), declinando en la mañana.
- Aumentos en la fase lútea, y durante el embarazo, retornando a valores normales antes del parto.
- El estado de la Vit K también afecta el % de carboxilación por lo tanto a su actividad.
- Como ocurre con la PTH es INESTABLE, por lo que se debe procesar de manera rápida y conservar en frío.
- Su valor disminuye en el tratamiento con corticoides.



PROPEPTIDOS DE COLAGENO TIPO I (CARBOXI Y AMINO TERMINAL)



- El procolágeno tipo I (precursor del colágeno tipo I) es sintetizado por los osteoblastos.
- Los fragmentos PICP y PINP son propéptidos eliminados del procolágeno tipo I durante la formación de la fibra de colágeno .
- Son evaluados con inmunoensayos.


PINP	PICP
VR: M (19-84)Ug/L H (20-76)Ug/L	VR : M (50-170)ug/L H (38-202) ug/L

MARCADORES DE RESORCION OSEA O DE ACTIVIDAD OSTEOCLASTICA



HIDROXIPROLINA


- Es el aminoácido más abundante de las fibras de colágeno, en plasma esta presente de tres maneras : **LIBRE, UNIDA A PEPTIDOS Y A PROTEINAS** (éstas últimas no se eliminan por riñón)
- Su excreción urinaria (10%total) es principalmente un índice de la actividad de resorción ósea, pero también de formación, por ello, su ***excreción es mayor en los niños que en adultos.***
- Presenta un pico secundario de eliminación en la pubertad
- Su eliminación urinaria está influida por la dieta (evitar ingesta de gelatinas durante las 48 hs previas al estudio)
- Métodos disponibles colorimétricos y por HPLC.
- ***INDICADOR POCO SENSIBLE Y ESPECIFICO.***



**Hidroxirolina
Urinaria (24 hs)
VR :(15 - 62 mg/24 Hs.)**

CROSS LINKS Piridinolina (Pyr) y Deoxipiridinolina (Dpyr)

- Cuando el colágeno se deposita sobre la matriz ósea, lo hace en forma de fibrillas longitudinales al contactarse entre ellas se van estabilizando entre aminoácidos mediante puentes llamados cross-links, así se van formando *estructuras cíclicas* llamadas de manera general **PIRIDINOLINAS**.
- Cuando el residuo interactuante es :
HIDROXILISINA : PIRIDINOLINAS
LISINA : DEOXIPIRIDINOLINA
- Son indicadores de la destrucción del colágeno óseo **MADURO**.





CROSS LINKS Piridinolina (Pyr) y Deoxipiridinolina (Dpyr)

- Aumentan en la sangre cuando el colágeno es degradado por los osteoclastos, y **sin metabolizar** se excretan por orina.
- La Pyr además de hueso se encuentra en cartilago y otros tejidos conectivos, mientras que la D-pyr se ubica casi exclusivamente en hueso y dentina (Por ello este **marcador es mas especifico como indicador de RO**)
- Se excretan por orina en un 40% aproximadamente libres y un 60% unidos a péptidos pequeños.
- Los valores en los adultos son estables y aumentan un 50 -100 % en las mujeres menopáusicas , por la disminución del estradiol.
- Se utilizan métodos de QUIMIOLUMINISCENCIA, sobre muestras de **orina ocasional**. (También se realizan sobre muestras de 24 hrs)

VR: Dpyr Hombres: 2.30 - 5.40 nM/mM cr / Mujeres: 3.00 - 7.40nM/mM cr


Pyr: Hombres: 8.00 a 24.00 nmol/mmol / Mujeres: 10.00 a 37.00 nmol/mmol



TELOPEPTIDOS

MARCADORES MAS SENSIBLES Y ESPECIFICOS DE RESORCION OSEA.

- 1) N- TELOPEPTIDOS (NTX)
- 2) *C-TELOPEPTIDOS (CTX) o BETA CROSS LAPS*





BETA CROSS LAPS

- Los fragmentos de C-telopéptidos (CTX), son liberados a la circulación por la **degradación del colágeno tipo I**, mediado por los osteoclastos.
- Ritmo: máxima concentración de CTX durante la noche, descenso marcado hasta las 11:00 horas
- El valor sérico del CTX es predictivo del riesgo de fractura.
- Muestra: **SUERO**
- Método: **Electroquimioluminiscencia.**

Mujeres:

Premenopausicas: 0.14 a 0.57 ng/ml
Postmenopausicas: 0.22 a 1.0 ng/ml

Hombres:

30 - 50 años: 0.14 a 0.58 ng/ml
51 - 70 años: 0.20 a 0.70 ng/ml
Mayor de 70 años: 0.23 a 0.85 ng




Figura 1 – Representação esquemática da origem dos fragmentos carboxiterminais do colágeno tipo I. A digestão do colágeno maduro libera peptídeos únicos originados pela associação entre as diferentes fibrilas

Pyr, Dpyr y Telopéptidos

-UTILIDAD CLINICA-

- ★ Identificar pérdida ósea aumentada (aumento de actividad osteoclástica)**
- ★ Una caída de estos marcadores un 50% entre el 3er y 6to mes de tratamiento indicaría una buena respuesta.**

Gracias por su atención

